

# 12. MENTALNE BOLESTI

## I

### BOLESTI JETRE







U specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti evidentirano je 5.341 pregleda kod muškaraca (48,7% u ukupnom), a kod žena 5.628 (51,3%).

*U specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti, najčešće evidentirane su kod oba spola neuroze i afektivni poremećaji povezani sa stresom i somatotropni poremećaji: kod muškaraca 30,2% pregleda, a kod žena 36,6% pregleda.*


Na drugom mjestu kod oba spola su shizofrenija, shizotipni i sumanuti poremećaji: kod muškaraca 21,7% i kod žena 17,5%. Na trećem mjestu kod muškaraca su poremećaji uzrokovani alkoholom (10,7%), a kod žena demencije (7,8%).

**Tablica 4 - Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja registrirani u specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti u Istarskoj županiji 2022. godine po spolu**

	Ukupno	Muški		Ženski	
		Broj	%	Broj	%
<b>UKUPNO</b>	<b>10.969</b>	<b>5.341</b>	<b>100,0</b>	<b>5.628</b>	<b>100,0</b>
Demencija F00-F03	737	300	5,6	437	7,8
D.p. i p.p. uzrokovani alkoholom F10	708	572	10,7	136	2,4
D.p. i p.p. uzrokovani psihoaktivnim tvarima F11-F19	202	158	3,0	44	0,8
Shizofrenija, shizotipni i sumanuti poremećaji F20-F29	2.147	1.160	21,7	987	17,5
Neuroze i afektivni p. povezani sa stresom i somatoformni p. F40-F48	3.676	1.614	30,2	2.062	36,6
Duševna zaostalost F70-F79	99	56	1,0	43	0,8
Ostali d.p. i p.p.	3.400	1.481	27,7	1.919	34,1


U zdravstvenim ustanovama u IŽ zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja hospitalizirano je 943 osoba, 507 (53,8%) muškarca i 436 žena (46,2%).





**Slika 1 - Vodeće dijagnoze u skupini duševnih poremećaja kod hospitaliziranih osoba muškog spola u Istarskoj županiji u 2022.g.**

Vodeće dijagnoze u skupini duševnih poremećaja kod hospitaliziranih žena su: F32-F33 depresivni poremećaji (15,6%), reakcije na teški stres i poremećaji prilagodbe (11,2%), alkohol odnosno nespecificirana demencija (po 9,4%), te ostali poremećaji uzrokovani oštećenjem mozga (8,9%). Navedenih pet vodećih dijagnoza uzrok su dvije trećine (54,6%) hospitalizacija u IŽ kod žena zbog duševnih poremećaja.




**Slika 2 - Vodeće dijagnoze u skupini duševnih poremećaja kod hospitaliziranih osoba ženskog spola u Istarskoj županiji u 2022.g.**

Kod muškaraca više od polovine (57,4%) hospitalizacija je u dobi 30-59 godina, a kod žena više od polovine hospitalizacija (56,7%) je u dobi iznad 50 godina.





Prema podacima HZJZ-a, stanovništvo IŽ zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja u 2022.g. najčešće je hospitalizirano u OB Pula (49,7%), Insuli Rab (14,8%) i KBC Rijeka (11,7%).



**Slika 4 - Gravitacije hospitaliziranih stanovnika Istarske županije zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja u 2022. godini**

Izvor: HZJZ

Prema podacima HZJZ-a, kod stanovništva IŽ u zdravstvenim ustanovama u RH u 2022.g. bilo je ukupno 1.446 hospitalizacija zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja: 809 muškaraca (55,9%) i 639 žena (44,1%). Većina hospitaliziranih je u dobi od 30 do 69 godina (65,1%), 55,9% žena i 72,4% muškaraca.

**Tablica 9 - Broj hospitalizacija stanovništva Istarske županije zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (F00-F99) u ustanovama u RH u 2022.g. po dobi i spolu**

Spol	Ukupno	Dobne skupine								
		0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
<b>UKUPNO</b>	1.448	12	116	152	239	267	261	176	108	117
<b>Muški spol</b>	809	7	45	87	146	182	158	100	43	41
<b>Ženski spol</b>	639	5	71	65	93	85	103	76	65	76

Izvor: HZJZ

Vodeće dijagnoze kod muškaraca iz IŽ hospitaliziranih u RH u ovoj skupini bolesti i stanja su: duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom (23,1%), shizofrenija (13,7%), reakcije na teški stres i poremećaji prilagodbe (8,2%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani opijatima (7,0%) te bipolarni afektivni poremećaj (5,9%). Kod hospitaliziranih žena zbog ove skupine vodeće su dijagnoze: depresivni poremećaji F32-F33 (15,8%), reakcije na teški stres i poremećaji prilagodbe (8,1%), shizofrenija (7,8%), ostali duševni poremećaji izazvani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću (6,9%) te bipolarni afektivni poremećaj (6,7%).













**Tablica 1 - Bolesti jetre registrirane u primarnoj zaštiti (ugovorne ordinacije) u Istarskoj županiji u 2022.g. po spolu**

	<b>Ukupno</b>	<b>Muški spol</b>	<b>Ženski spol</b>
<b>Bolesti jetre K70-K77</b>	3.086	1.869	1.217

Izvor:CEZIH

U specijalističko-konzilijskoj djelatnosti u IŽ registrirano je 615 oboljelih od bolesti jetre (lani 658), što čini 0,2% u ukupno evidentiranim pregledima u svim ordinacijama SKZZ. Većinu čine muškarci (63,4%). U dobroj skupini 20-64 godine je 61,0% registriranih pacijenata. Broj registriranih u specijalističko-konzilijskoj djelatnosti čini 19,9% registriranih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

*U odnosu na 2021. godinu, u svim ordinacijama u specijalističko-konzilijskoj djelatnosti registrirano je za 6,5% manje bolesti jetre.*

**Tablica 2 - Bolesti jetre registrirane u specijalističko-konzilijskoj djelatnosti (sve ordinacije) u Istarskoj županiji 2022.g. po dobi i spolu**

	<b>Ukupno</b>	<b>0-6 g.</b>	<b>7-19 g.</b>	<b>20-64 g.</b>	<b>65 i više g.</b>
<b>UKUPNO</b>	615	1	8	375	231
<b>Muški spol</b>	390	-	8	228	154
<b>Ženski spol</b>	225	1	-	147	77

U 2022.g. u zdravstvenim ustanovama u IŽ (OB Pula i stacionari IDZ) zbog bolesti jetre hospitalizirano je 78 osoba, većinom muškarci (74,4%). Najčešće dijagnoze su alkoholna bolest jetre (39,7% hospitaliziranih) te fibroza i ciroza jetre (34,6%). Većina hospitaliziranih je bila u dobi iznad 60 godina (65,4%).



## 12.2.1. BOLESTI JETRE KAO UZROK SMRTI

Od bolesti jetre umrle su 63 osobe (većina (56) muškarci), a vodeći uzrok je alkoholna bolest jetre (42).


**Tablica 5 - Umrli od bolesti jetre u Istarskoj županiji 2022. godine po dobi i spolu**

Šifra MKB	Spol	Ukupno	30-39 g.	40-49 g.	50-59 g.	60-69 g.	70-79 g.	80+ g.
Bolesti jetre (K70-K76)	UK	63	1	3	13	19	19	8
	M	56	1	3	13	16	18	5
	Ž	7	-	-	-	3	1	3
Alkoholna bolest jetre (K70)	UK	42	1	3	12	12	12	2
	M	39	1	3	12	10	12	1
	Ž	3	-	-	-	2	-	1
Zatajenje jetre, nesvrstano drugamo (K72)	UK	1	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	Ž	-	-	-	-	-	-	-
Fibroza i ciroza jetre (K74)	UK	20	-	-	1	7	7	5
	M	16	-	-	1	6	6	3
	Ž	4	-	-	-	1	1	2

Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

Dobno-standardizirane stope smrtnosti pružaju mogućnost usporedbe među područjima s različitim dobnim sastavom stanovništva koji bi mogao utjecati na naše zaključivanje o pojavnosti određenih bolesti pa tako i uzroka smrti. Stope za IŽ su računate za 2012.-2020. i 2022.g. prema Procjeni broja stanovnika DZS-a, a za 2021.g. na Popis 2021.g. Stope za RH i EU preuzete su od *European Health Information Gateway, WHO Regional Office for Europe* (link <https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/>). Za standardizaciju je korišteno standardno europsko stanovništvo 1976. (koje koristi i WHO).


Dobno-standardizirane stope smrtnosti uzroka smrti povezanih s alkoholom za ukupnu dob su niže od hrvatskih, ali nešto više od europskih stopa.



**Slika 1 - Dobno-standardizirane stope smrtnosti uzroka smrti povezanih s alkoholom\*, na 100.000 stanovnika (ukupna dob)**

\*C15, C32, F10, K70, K73, K74, K76, svi vanjski uzroci


Dobno-standardizirane stope smrtnosti od kronične bolesti jetre i ciroze za ukupnu dob niže su od stopa RH i veće od EU.



**Slika 2 - Dobno-standardizirane stope smrtnosti krovične bolesti jetre i ciroze\*, na 100.000 stanovnika (ukupna dob)**

\*K70, K73, K74

Dobno-standardizirane stope smrtnosti od kronične bolesti jetre i ciroze za dob 0-64 godine niže su od stopa RH i slične EU.



**Slika 3 - Dobno-standardizirane stope smrtnosti krovične bolesti jetre i ciroze, na 100.000 stanovnika (0- 64 godine)**