

- liječenje: antivirusnim lijekovima smanjuje se broj virusa u organizmu, time se štiti obrambeni sustav i odgađa pojava bolesti.

**Hepatitis B** - virusna upala jetre koja često vodi u kronično oštećenje jetre.

- prenosi se: 1. spolnim putem, 2. krvlju i 3. priborom za intravensku primjenu droge;
- od zaražavanja do početka bolesti može proći od 2 do 6 mjeseci;
- narkomani su često zaraženi i dugotrajni prenositelji zaraze.



**HPV infekcija** - uzrokovana je humanim papiloma virusima.

- česta je kod mladih;
- može se javiti i bez simptoma ili se pojave šiljate bradavice na rodnici, penisu ili oko čmara;
- HPV infekcija uzrokuje predstadij raka vrata maternice;
- liječi se kirurški ili premazivanjem.

**Genitalni herpes** - uzročnik je virus herpes simplex tip 2 koji je vrlo zarazan.

- osim spolnim dodirom (vaginalni, oralni, analni), prenosi se i s majke na dijete tijekom poroda i drugim genitalnim dodirom;
- može izazvati trajne zdravstvene posljedice na djetetu;
- zaražena osoba često nosi u sebi virus cijelog života.

## UPAMTITE

- 1 U spolne odnose stupiti što kasnije.
- 2 Pri spolnom odnosu koristiti zaštitu (prezervativi, femidomi).
- 3 Ne mijenjati često spolne partnere.
- 4 Apstinencija ili trajno uzajamno vjerna veza zdravih partnera jedina je sigurna prevencija.
- 5 Kod prvih znakova spolno prenosive bolesti odmah se javiti liječniku.
- 6 Neliječene spolno prenosive bolesti mogu ostaviti trajne posljedice na zdravlje, a mogu biti i smrtonosne (AIDS npr.).



# Spolno prenosive bolesti



## SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI

*su zarazne bolesti koje se prenose sa zaražene osobe na zdravu osobu.*

- Do infekcije dolazi pri vaginalnom, oralnom ili analnom spolnom kontaktu.
- Uzročnici bolesti su razni mikroorganizmi: bakterije, virusi, gljivice, paraziti.
- Uzročnici se nalaze u spermii, vaginalnom sekretu, krvi, na sluznici i koži.
- U organizam ulaze preko oštećenja sluznice, koja se javljaju pri spolnom odnosu.

### Simptomi spolno prenosivih bolesti

- pojačani iscijedak iz rodnice, penisa ili čmara (anusa);
- pečenje, žarenje ili svrbež u predjelu spolnih organa ili okolini čmara;
- bol pri spolnom odnosu;
- bol u donjem dijelu trbuha;
- bol i otok u preponama;
- bradavice, ranice ili mjehurići na spolnim organima, okolini čmara ili u ustima.



### Najčešće spolno prenosive bolesti

**Klamidijaza** - uzročnik je bakterija *Chlamydia trachomatis*.

- najčešća je spolno prenosiva bolest, prvenstveno kod adolescenata;
- nakon 5-10 dana u žena se javlja iscijedak, pečanje, bol u donjem dijelu trbuha te bolovi pri spolnom odnosu zbog upale rodnice i grlića maternice;
- često je infekcija kod žena bez simptoma, a upala se širi na jajnike, jajovode, maternicu i okolne organe, što može izazvati neplodnost i vanmaterničnu trudnoću;
- posebno su ugrožene mlade djevojke u kojih se, zbog nezrelosti spolnih organa, infekcija lakše širi;
- oba partnera se liječe antibioticima.



**Gonoreja (triper, kapavac)** - uzrokovan je bakterijom.

- 3. do 5. dan nakon spolnog kontakta sa zaraženom osobom javlja se gnojni iscijedak kao posljedica upale rodnice, grlića maternice i mokraćne cijevi kod muškaraca;
- ukoliko se ne liječi, može doći do neprohodnih jajovoda, izvanmaterične trudnoće i neplodnosti žene i muškarca;
- liječe se oba partnera antibioticima.

**Sifilis** - uzročnik je bakterija koja se krvotokom širi po cijelom tijelu.

- nakon 3 tjedna od infekcije javljaju se ranice na rodnici, penisu i anusu koje nestaju za 4-6 tjedana;

- u drugom stadiju bolesti uzročnik se širi u krvotok, javlja se osip, povišena temperatura, grlobolja, ranice u ustima;
- nakon više godina, u trećem stadiju bolesti, javljaju se znaci oštećenja srca, mozga, kostiju i unutarnjih organa;
- posebno je ugroženo dijete majke koja je oboljela od sifilisa (smrt, teška oštećenja);
- liječe se oba partnera antibioticima.



**AIDS ili SIDA** - sindrom stečenog nedostatka imuniteta, uzrokovan virusom HIV.

- virus napada obrambene stanice što dovodi s vremenom do slabljenja obrambenog sustava i sklonosti infekcijama i zločudnim bolestima;
- virus se nalazi u krvi, spermii, vaginalnom sekretu i majčinom mlijeku u koncentraciji koja može izazvati bolest;
- virusa ima i u slini i suzama, ali u niskoj koncentraciji koja neće izazvati infekciju;
- prenosi se: 1. spolnim putem; 2. krvlju (najčešće zaraženim špricama i iglama) i 3. sa majke na dijete (tijekom trudnoće, poroda i dojenja);
- od zaražavanja do početka bolesti može proći od nekoliko tjedana pa do više godina (10-15), a za to vrijeme zaražena osoba može prenosi virus na druge osobe;
- znaci bolesti: dugotrajan kašalj, proljev, umor, gubitak tjelesne težine, tamne mrlje na koži (Kaposijev sarkom), otečeni limfni čvorovi;